

УТВЕРЖДАЮ:

директор клиники (юр.адрес, адрес филиала)



ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ
ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И
ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ
ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Номер результата	правила, условия оказания медицинских услуг, выполнения эффективного и безопасного	Гарантийный срок на сохранения	Необходимы возможные последствия бездействия при истечении гарантированного срока результата лечения		
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья.	6 месяцев достигнутый лечебный результат	повторная процедура при наличии ретикулярных вен показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных

2	Стволовая склеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бани в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботонико в	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжесть ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 1*
3.	ЭВЛК	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бани в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботонико в.	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжесть ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение посещения	12 месяцев	повторная процедура	появление новых варикозно расширенных

		соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессион ного белья, прием флеботонико в. Соблюдение лечебно- охранительн ого режима в послеоперац ионном периоде	при наличии вен, увеличение их показаний количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
5	Минифлеб- эктомия	Исключение 12 месяцев посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессион ного белья, прием флеботонико в. Соблюдение лечебно- охранительн ого режима в послеоперац ионном периоде	повторная процедура при наличии вен, увеличение их показаний количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

Примечание 1*

гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
неврологические нарушения: мигренеподобные боли, нарушения зрения, речи,
транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение
кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным
развитием летального исхода.

Примечание 2*

Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной
вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в
области медицинского вмешательства;
Развитие венозного тромбоэмболизма,
летального исхода.